

## KALAFIOR

**POLYVERSUM  
CAULI ACTIVE START  
ERNIA  
BIOCAL  
VAPOR GARD  
PROTECTOR**



### Rozsada:

- W fazie początku liścia właściwego  
**Polyversum WP – 50 gr na 100litrów wody**  
- Obficie opryskiwać  
**UWAGA:**  
Przy stosowaniu Polyversum nie stosować żadnego innego fungicydu doglebowego.
- Tuż przed wysadzeniem  
**Vapor Gard - stężenie 1 %** (tzn. 100ml na 10litrów wody)  
- Obficie opryskiwać  
**UWAGA:**  
Zabieg Vapor Gardem powinien być ostatnim wykonywanym zabiegiem.  
Do wytworzenia warstwy ochronnej preparat wymaga 1 – 2 h światła dziennego.

### W polu

#### Zapobieganie chorobom fizjologicznym

- Od początku inicjacji róży  
**BIOCAL - dawka 1,25litra / ha + Protector 300ml/ha**
- Kolejny zabieg po 14 dniach  
**BIOCAL - dawka 1,25litra / ha + Protector 300ml/ha**

#### ZAPOBIEGANIE ALTERNARIOZIE RÓŻY

- 10 dni po wysadzeniu  
**Polyversum 100 g/ha + Protector 300 ml/ha**
- Gdy roślina ma ok. 20 cm  
**Polyversum 100 g/ha + Protector 300 ml/ha**  
- wykonać 2 – 3 zabiegi w odstępie 10 dni

**UWAGA:**  
Zachować 7 - 10 dni odstępu od stosowania fungicydów chemicznych.  
Umyć opryskiwacz z dodatkiem środka do mycia opryskiwaczy.  
Przygotować roztwór zgodnie z etykietą preparatu.  
**NIE STOSOWAĆ Z JAKIMKOLWIEK ZWILŻACZEM !!!**

## ZAPOBIEGANIE PROBLEMOM ZE WZROSTEM

- W razie jakichkolwiek problemów ze wzrostem w okresie wegetacji  
**Terra Sorb Complex 1.25 – 1.5 l/ha**  
**2 – 3 zabiegi co 14 dni**

## PROGRAMY WALKI Z KIŁĄ KAPUSTNYCH !

### Program profilaktyczny

- 1 – 2 dni przed wysadzeniem  
**Ernia 1.5 % + Cauli Active Start 1,5 %**  
MOCZENIE SADZONEK lub  
OBFITE RÓWNOMIERNE PODLEWANIE  
PRZED WYSADZENIEM W ILOŚCI 2 L/M<sup>2</sup>
- **OK. 10 – 20 DNI PO WYSADZENIU ROZSADY**
  - **ERNIA 2.5 L/HA (max ilość wody 300l/ha)**
  - KOLEJNE ZABIEGI WYKONYWAĆ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB BIORĄC POD UWAGĘ WSZYSTKIE PARAMETRY UPRAWOWE.  
W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA INFEKCJI DOKONAĆ KOLEJNYCH ZABIEGÓW :
    - **ERNIA 2,5 L/HA + CAULI ACTIVE START 2,5 L/HA**

### **UWAGA:**

Należy prowadzić ciągle obserwacje z pobieraniem prób, szczególnie na polach narażonych na infekcję. W przypadku wystąpienia obfitych opadów deszczu (burzowych lub ciągłych) powodujących powstanie warunków beztlenowych w glebie, zabieg należy wykonać tak szybko jak to jest możliwe – nawet przed upływem 10dni od posadzenia !

### Program interwencyjny

- Od razu po zauważeniu objawów kiły  
**Ernia 8 litrów + Cauli Active Start 2,5 litra**
- W zależności od przebiegu pogody może zaistnieć konieczność wykonania kolejnych zabiegów !!!  
**UWAGA !**  
**ZBYT DŁUGI OKRES BRAKU POWIETRZA W GLEBIE SKUTKUJE BRAKIEM SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA PRODUKTÓW !!!**