

VAPOR GARD

Środek z grupy adiuwantów zalecany do łącznego stosowania z fungicydami miedziowymi w celu ochrony przed chorobami kory i drewna drzew owocowych w okresie bezlistnym. Środek ograniczający pęknięcie owoców czereśni i wiśni oraz zapobiegający nadmiernej transpiracji roślin po wysadzeniu w pole.

Zawiera: produkty oligomeryzacji beta pinenu – 96%

Zawartość netto: 5L

■ **VAPOR GARD** to naturalny preparat pochodzenia roślinnego z grupy adiuwantów, zalecany do łącznego stosowania z preparatami miedziowymi w uprawach roślin sadowniczych w celu ochrony przed chorobami kory i drewna w okresie pozbiornym i bezlistnym. W uprawach drzew pestkowych czereśni, wiśni, śliw oraz brzoskwiń zastosowanie środka **VAPOR GARD** ogranicza pęknięcie owoców oraz poprawia właściwości przechowalnicze śliwek. Ogranicza ordzawianie jablek. W uprawach warzywniczych zapobiega nadmiernej transpiracji roślin po wysadzeniu rozsady. Ogranicza wpływ wiosennych przymrozków.

■ **VAPOR GARD** tworzy cienką, elastyczną błonkę zabezpieczającą opryskane zawiązki owoców i wykształcone owoce przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych przez ok. 3 tygodnie. Po upływie 1 godziny po zabiegu, pod wpływem światła słonecznego środek polimeryzuje a błonka ochronna osiąga pełną odporność na zmywanie przez deszcz. Elastyczna błonka ulega rozciąganiu w miarę wzrostu owoców.

STOSOWANIE

Ochrona przed chorobami kory i drewna (rośliny sadownicze) – zabieg opryskiwania należy wykonać w okresie pozbiornym oraz w okresie bezlistnym łącznie z preparatami miedziowymi, stosując stężenie 0,1 % (100 ml na 100l wody). Dodatek **VAPOR GARD** zwiększa efektywność wykonywanych zabiegów preparatami miedziowymi poprzez utworzenie elastycznej powłoki redukującej wpływ negatywnych czynników zewnętrznych przez okres ok. 3 tygodni. **VAPOR GARD** należy stosować z każdym zabiegiem preparatami miedziowymi w okresie bezlistnym drzew.

Ograniczenie pęknięcia owoców – (drzewa pestkowe) – zabieg opryskiwania wykonać ok. 3 tygodni przed zbiorem stosując ciecz użytkową o stężeniu 0,75 % w ilości 750 - 1000 l/ha, tak aby zapewnić dokładne pokrycie owoców. W przypadku obfitych deszczy w okresie 2 tygodni po oprysku, należy zabieg powtórzyć stosując stężenie 0,35 %. **Uwaga: przy zabiegu ograniczającym pęknięcie owoców nie wolno łączyć środka VAPOR GARD w jednym oprysku z innymi środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi (ryzyko powstania nalotu na owocach)**

Ograniczanie ordzawiania jablek – pierwszy zabieg wykonać, gdy zawiązki mają 4-6 mm, zabieg powtórzyć po upływie 7-10 dni. W przypadku utrzymujących się deszczy i zimnej pogody, należy wykonać trzeci zabieg po upływie ok. 10-14 dni. Stosować ciecz użytkową o stężeniu 0,25 % Należy dokładnie pokryć zawiązki. **Uwaga: przy zabiegu ograniczającym ordzawianie jablek nie wolno stosować środka VAPOR GARD łącznie ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi za wyjątkiem preparatu BioCal.**

Ograniczenie transpiracji (rosada warzyw/sadzonki truskawek) – zabieg wykonać opryskiwaczem plecakowym. Opryskać dokładnie rozsade/sadzonki przed wysadzeniem, stosując stężenie 1-2 %, w zależności od spodziewanych warunków po wysadzeniu.

Ograniczenie wpływu przymrozków w warzywach – zabieg wykonać 24-48 godzin przed spodziewanymi przymrozkami w stężeniu 1-2 %.

VAPOR GARD pod wpływem promieni słonecznych polimeryzuje dzięki czemu utworzona błonka jest bardziej trwała, dlatego najlepiej stosować go rano w dzień słoneczny, tak aby po zastosowaniu przez co najmniej 1 godz. był poddany działaniu promieni słonecznych. W dzień pochmurny czas polimeryzacji może się wydłużyć do 2 godzin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

- Wymieszać wstępnie **VAPOR GARD** w wiadrze z ciepłą wodą a następnie dodać do opryskiwacza do połowy wypełnionego cieczą roboczą.
- Uzpełnić opryskiwacz z włączonym mieszałem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać par/mgły, oparów cieczy użytkowej. Każdorazowo przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz po zakończeniu pracy myć ręce i odsłonięte partie skóry wodą z mydłem. Nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnym miejscu. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

UWAGI:

- Nie chroni roślin w 100 %
- Nie chroni nowych przyrostów
- Nie chroni przed wysalaniem

- Działa drażniąco na skórę.
- Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe zmiany.
- Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
- Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- W przypadku kontaktu ze skórą:umyć dużą ilością wody
- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- Zanieczyszczonej odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
- Zebrać wyciek.
- Zawartość/pojemnik usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Produkt zawiera: produkty oligomeryzacji beta-pinenu (nr WE: 701-246-8); etoksylowane alkohole C12-C16 (nr WE: 500-221-7, nr CAS: 68551-12-2); kwas benzenosulfonowy 4-C10-13-alkilo- pochodne, sole wapnia (nr WE: 932-231-6, nr CAS: 1335202-81-7).



Uwaga



PRODUCENT:

Miller Chemical and Fertilizer Corporation
Radio Road, Hanover
Pennsylvania 17331, USA
tel: +44(0)7771 893 006

IMPORTER I DYSTRYBUTOR:



Bioagris Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Lubawska 4A
03-011 Warszawa
tel.: +48 793 797 757
info@bioagris.pl
www.bioagris.pl

Zawartość netto: 5L

Okres ważności:

3 lata

Data produkcji i nr partii:

na opakowaniu